


EGNA ANTECKNINGAR

2009-01-12

RÅD
OCH
REKOMMENDATIONER
KRING
INFEKTIONER
I
FÖRSKOLA



BARNHÄLSOVÅRDEN
KALMAR LÄN
2009

HYGIENRÅD

Handhygienen oerhört betydelsefull!

- Tvätta händerna efter toalettbesök, blöjbyte, snutit barn och före mat
Engångshanddukar, flytande tvål och rikligt med handsprit
- Vid blöjbyte engångshandskar, engångsunderlägg
- Lock på blöjhink
- Lock nedfällt på toalettstol innan spolning
- Daglig städning
- Daglig utevistelse (flera timmar)
- Handskar rekommenderas vid all blodkontakt

HEMMA FRÅN FÖRSKOLA?

- Barnets behov avgör, (EJ föräldrarnas eller personalens).
- Barnets allmäntillstånd avgör –barnet ska orka vara med i aktiviteterna, inklusive flera timmars utevistelse.
- Barn med feber, även lindrig, ska vara hemma. Ett feberfritt dygn hemma, utan febernedsättande.
- Barn med besvärlig hosta och därmed störd nattsömn ska vara hemma.
- Efter 2 dygns antibiotikabehandling kan barnet återgå till förskolan om gott allmäntillstånd råder.

REKOMMENDATIONER

Efter diarré/kräkningar:

- Ska kunna äta normalkost.
- Ingen kräkning eller vattentunn diarré på minst 2 dygn. Observera att det kan ta längre tid innan normaliserad avföring efter maginfluensa.
- Syskon som går på samma förskola som det sjuka barnet stannar hemma.

Ögoninflammation:

- Röda ögonvitor och kladd i samband med förkylningar oftast virus och kräver ingen behandling eller hemmavistelse om barnet är piggt.
- Om rött öga med var utan samtidig förkylning kontaktar föräldrarna BHV eller VC för bedömning.

Impetigo – ”svinkoppor”:

- Barn i förskolan bör vara hemma tills såren slutat vätska och gul skorpa inte längre återbildas. OBS! Kan förväxlas med andra munsår. Föräldrar kontaktar BHV alternativt VC vid osäkerhet.

BHV - Barnhälsovård

VC - Vårdcentral